

Las instrucciones para Myringotomy Bilateral con la Introducción de Tubo de Ventilación

1. Por favor no dé al niño nada comer ni beber después medianoche la noche antes de sugery. Después que la cirugía, una dieta regular se puede reasumir.
2. Use la oreja deja caer tres vez un día de los primeros tres días después de la cirugía. Si su niño se queja de quemar cuando las gotas se usan, discontinúen el uso.
3. El desagüe de la oreja es normal para los primeros pocos días después de la cirugía. Si el desagüe ocurre después que los primeros tres días, llama por favor nuestra oficina y tiene un número de teléfono de farmacia disponible. Llamaremos en una gota antibiótica de ojo a ser usado en la oreja.
4. Use Niños Tylenol o Tempra cada cuatro o seis horas, cuando necesitado para el dolor. Ningún Mortin ni Advil para los primeros dos días después de la cirugía.
5. Evite agua que obtiene en las orejas. Podemos quedar a su niño con tapones de oreja de Doctor, o si usted prefiere, nuestro audiologist hará los moldes de floatable de costumbre. Usted puede comprar también forma de masilla de oreja de Impermeable su tienda de farmacia o grocercy.
6. Vuelva para la visita operativa del poste tres semanas después de la cirugía, y otra vez en seis meses después de la cirugía para una evaluación que oye.
7. Llámenos por favor para cualquiera preguntamos o concernimos que usted puede tener considerando su posición de niños en (770) 777-1100.